

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGỌC SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /CV – UBND

Ngọc Sơn, ngày tháng năm 2023

V/v tăng cường chăm sóc, điều tra
phát hiện và phòng trừ sâu bệnh
hại trên một số loại cây trồng vụ
Xuân 2023.

Kính gửi: Các thôn trong toàn xã.

Qua công tác kiểm tra thăm đồng, hiện nay trên cây trồng đang ở giai đoạn sinh trưởng và một số đối tượng gây hại chính như sau:

*** Cây lúa:** Bước vào thời kỳ làm đồng đây là thời kỳ quyết định năng suất lúa sau này

- Bệnh đạo ôn lá: phát sinh gây hại cục bộ trên giống lúa Thái Xuyên 111, TBR225 và một số giống lúa nếp

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn: phát sinh gây hại nhẹ trên những ruộng bón thừa đạm, tỷ lệ bệnh 2%, nơi cao 5%, cấp bệnh C1.

- Bệnh nghệt rễ-ngộ độc hữu cơ: Phát sinh ở trà sớm, trà chính giai đoạn đẻ nhánh trên những ruộng không giải phóng đất sớm, không xử lý đất, ruộng chua trũng, tỷ lệ bệnh TB: 8%, nơi cao 20%

- Chuột: gây hại cục bộ trên những diện tích gần gò đồi bờ rừng, giai đoạn lúa thời kỳ đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ

*** Cây ngô:** đang giai đoạn cây con, 4-5 lá - Sâu keo mùa thu: gây hại rải rác trên ngô thời kỳ cây con, 4-5 lá, sâu cắn phá nõn ngô làm cây phát triển chậm, mật độ TB 1,0 con/m², nơi cao 3,0 con/m².

*** Cây keo:**

- Bệnh phấn trắng: phát sinh gây hại rải rác trong điều kiện thuận lợi (tháng 3, tháng 4 hàng năm)

Trước diễn biến của tình hình thời tiết, thời kỳ sinh trưởng và sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Xuân năm 2023, để chủ động tăng cường công tác chăm sóc, điều tra phát hiện và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh phát sinh, không để ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. UBND xã đề nghị ông trưởng thôn triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Đối với cây lúa: cây lúa chuẩn bị bước vào thời kỳ làm đồng, đây là thời kỳ quyết định năng suất lúa sau này, đề nghị UBND các xã, thị trấn hướng dẫn bà con bón thúc đón đồng (khi 10% lá đóng thắt eo) bằng phân bón NPK (chuyên thức) lượng bón 25kg/sào; hoặc bón phân đơn: đạm 2-3kg/sào, kali 4-5kg/sào, ruộng nào lớp thì không bón thêm đạm, chỉ bón kali, kết hợp làm cỏ, sục bùn, giữ mực nước

trong ruộng 3-5cm, những diện tích bị hạn thiếu nước chăm sóc tiến hành phun phân qua lá để bổ sung dinh dưỡng cho cây làm đồng.

- Đối với cây ngô: bón thúc lần 1 cho ngô khi cây 4-5 lá với lượng bón: 5-6kg đạm/sào, 3-4kg kali/sào, ruộng không chủ động nước thì hòa tan phân với nước để tưới, kết hợp làm cỏ, vun gốc.

- Đối với cây sắn: chăm dặm cây sắn bị mất khoảng để đảm bảo mật độ

- Đối với cây keo: thường xuyên phát dọn thực bì, tỉa cành keo để tạo độ thông thoáng, hạn chế bệnh phấn trắng.

*** Công tác điều tra, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh**

1. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường xuống thôn hướng dẫn các hộ nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện các đối tượng sâu bệnh trên cây trồng như bệnh đạo ôn lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, rầy nâu, rầy lưng trắng lúa 2, sâu cuốn lá nhỏ lúa 2,... trên cây lúa; sâu keo mùa thu, sâu xám, bệnh huyết dụ trên ngô; bệnh khảm lá virus trên cây sắn; bệnh phấn trắng trên cây keo để có phương án phòng trừ kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh của thôn, xã về cách phát hiện loại dịch hại và biện pháp phòng trừ, cụ thể:

- Đối với cây lúa:

+ Bệnh đạo ôn lá:

Triệu chứng bệnh: Vết bệnh trên lá có hình thoi, giữa vết bệnh có màu nâu xám, ngoài có quầng màu vàng nhạt, bệnh nặng các vết bệnh liên kết với nhau làm khô lá

Khi bệnh chớm xuất hiện phải phun trừ ngay bằng các thuốc hóa học đặc hiệu: Kabim 30WP, Filia 525EC, Beam 75WP, Katana 20SC,...

Lưu ý: Khi lúa bị bệnh đạo ôn tuyệt đối không được bón phân đạm để tránh làm bệnh nặng hơn.

+ Bệnh đốm sọc vi khuẩn:

Triệu chứng bệnh: Vết bệnh xuất hiện ở ngọn và hai bên mép lá lan vào giữa lá, mép lá héo vàng sau chuyển thành màu xám, bệnh nặng làm khô lá.

Khi chớm bệnh phải phun thuốc hóa học trừ ngay: Starner 20WP, Physan 20L, Kasumin 2L, Starwiner 20WP, Sansai 200WP,...

Lưu ý: Khi lúa bị bệnh đốm sọc vi khuẩn tuyệt đối không được bón phân đạm để tránh làm bệnh nặng hơn.

+ Bệnh nghệt rễ-ngô độc hữu cơ:

Triệu chứng bệnh: Khi bệnh phát sinh ở mức độ nhẹ thì các lá gốc bị vàng, bệnh nặng các lá phía trên vàng, cây dễ nhách chậm, còi cọc, nhổ lên thấy bộ rễ vàng hoặc đen, không có hoặc ít rễ mới, nặng có thể làm bộ rễ thối đen và có mùi hôi tanh.

Khi chớm bệnh cần sử dụng biện pháp thủ công: bón phân chuồng (1 tạ/sào) vôi bột (20kg/sào), lân nung chảy (15kg/sào) kết hợp làm cỏ sục bùn và phun các loại phân qua lá.

* **Đối với cây ngô:** thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm đối tượng sâu keo mùa thu, thực hiện bắt sâu keo mùa thu ở nơi mật độ thấp, sử dụng bẫy bả chua ngọt để bẫy trưởng thành sâu keo, phun thuốc hóa học khi mật độ sâu >2 con/m² bằng các thuốc: Ammate 150EC, Clever 150SC, ...để phun trừ, khi phun lưu ý phun vào nõn để thuốc tiếp xúc với sâu.

* **Đối với cây sắn:** thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm bệnh khảm lá virus, nếu phát hiện bệnh cần nhổ bỏ tiêu hủy ngay, đồng thời phun trừ môi giới truyền bệnh (bọ phấn trắng) để tránh lây lan sang cây khỏe bằng các thuốc hóa học sau: Sutin 50SC, Osago 80WG, Cheestar 50WG,...

Nhận được công văn này đề nghị trưởng thôn thông báo trên lao truyền thanh của thôn để nhân dân biết và áp dụng thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trịnh Ngọc Giang